

嘉福浸信會幼兒園

036/18-19

KA FUK BAPTIST CHURCH PRE-SCHOOL
G/F, Fuk Lok House, Ka Fuk Estate, Fanling, N.T.
Telephone: 26771696 Fax: 26773280

Web Site: <http://www.kafuk.net>

E-mail: kafuk@biznetvigator.com

預防肺炎支原體感染

敬啟者：

本園於 2018 年 11 月 12 日(星期一)接獲 PN 班一位家長通知，其子女經醫生診治後，證明染上肺炎支原體病菌，因此本園勸喻 貴家長留意 貴子女的身體狀況。肺炎支原體是由一種名為肺炎支原體的細菌所引起的傳染病，在全年任何時間皆會發生，按過往趨勢顯示，在普通人口當中，大約 3-4 年便可能出現一次流行性爆發。

肺炎支原體最常引致急性上呼吸道及下呼吸道感染，患者通常要一段時間才會逐漸病發。大部份受到感染的病人只會出現輕微上呼吸道感染徵狀，包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、疲倦及頭痛等，只有 5-10% 的病人會患上非典型肺炎。健康及較年輕的社區感染肺炎患者中，肺炎支原體是最常見的病原體之一，介乎 5-20 歲的社區感染肺炎病人的感染率最高。雖然肺炎支原體感染通常只會引起輕微疾病，但嚴重併發症仍可出現，如重症肺炎、腦炎、腎功能受損和溶血性貧血等。

肺炎支原體感染主要在人與人之間經飛沫傳播。此病亦可透過直接接觸患者的鼻喉分泌物傳播；或透過接觸剛被患者分泌物染污的物件而間接傳播。該病菌可引致爆發，尤其以擠逼的學校/院舍的風險較高。潛伏期可介乎 1-4 星期。

現時並沒有疫苗可以預防肺炎支原體感染。家長應採取以下措施以減低感染機會：

1. 增強抵抗力有助預防感染，應保持均衡飲食、恆常運動、充足休息。
2. 注意個人和環境衛生，保持雙手清潔。當雙手被口鼻分泌物污染後，應立即用梘液洗手。
3. 咳嗽或打噴嚏時應掩蓋口鼻，並妥善棄置口鼻分泌物。
4. 如出現呼吸道感染病徵，應佩戴外科口罩。切勿上班或上學，並及早求醫。
5. 兒童應減少在公眾場所及人多擁擠的地方流連。

家長可登入衛生署衛生防護中心參閱有關「肺炎支原體感染」資料，並加以留意(<http://www.chp.gov.hk/tc/healthtopics/content/24/21283.html>)，多謝合作。

此致

_____ 家長

嘉福浸信會幼兒園校長

二零一八年十一月十二日

_____ 黃何玉蓮

謹啟